

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 60 F.
C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 142 (11/79) - 23 MAI 1979

/ VIGNE /

MILDIOU

Depuis le 19 mai, les conditions météorologiques sont favorables aux contaminations et les foyers primaires devraient apparaître dans les premiers jours de Juin. Nous rappelons que le concours de détection des premières taches est ouvert, et que vos réponses nous sont très précieuses pour évaluer la virulence de la maladie.

Dans les situations précoces, habituellement sensibles au mildiou, il est conseillé de réaliser un premier traitement préventif qui assurera la protection durant cette période de temps perturbé favorable à la maladie.

OIDIUM

Profiter du traitement éventuel contre le mildiou pour assurer la protection contre l'oïdium. Sinon, ne pas hésiter à faire un traitement spécifique, de préférence lors d'une période de beau temps.

VERS DE LA GRAPPE

Le vol est commencé dans les Charentes mais il est encore trop tôt pour intervenir, d'autant plus que l'Ugni blanc est assez peu sensible aux attaques de première génération.

/ ARBRES FRUITIERS /

TAVELURE-OIDIUM

Renouveler de toute urgence les traitements conseillés dans notre précédent bulletin si cela n'a pas encore été fait. Toute pluie supérieure à 30 mm entraîne un lessivage de la protection fongicide, et un nouveau traitement doit alors être réalisé sans attendre.

CARPOCAPSE

Le vol vient de commencer dans les secteurs les plus chauds de Charente-Maritime, mais il est beaucoup trop tôt encore pour traiter.

/ POMMES de TERRE /

MILDIOU

Dans les secteurs les plus chauds de la région (bordure atlantique, Iles de Ré et Ile d'Oléron), la maladie est déjà apparue et la lutte doit être activement menée. Dans le reste de la région, les traitements devront commencer précocement cette année si le temps doux et pluvieux persiste.

ENQUETE SUR LA NOUVELLE PRESENTATION de PHYTOMA

Nous demandons à nos abonnés qui reçoivent la revue "PHYTOMA"-DEFENSE des CULTURES" de bien vouloir nous indiquer leur opinion sur la nouvelle présentation de cette revue, en utilisant le coupon réponse situé au verso.

Nous vous remercions par avance.

P 366

MALADIES DES FEUILLES ET DE L'EPI des BLES d'HIVER

Jusqu'à présent, la situation était saine, mais la période perturbée qui vient de débuter le 19 Mai est très favorable à la septoriose (*S. nodorum*) et des traitements seront nécessaires partout où on verra apparaître la maladie sur les deuxièmes et troisièmes feuilles. Nous rappelons que la lutte contre septoriose (et fusariose) de l'épi est préventive, et que le stade de l'épiaison est le plus sensible. En conséquence, la décision de traiter ou non devra être prise rapidement dans les secteurs les plus précoces de la Charente-Maritime et du S.M. des Deux-Sèvres.

La rouille brune ne s'est pas encore manifestée dans la région, mais la persistance d'un temps doux et pluvieux constitue un risque très sérieux. En conséquence, sur variétés sensibles (Talent, Lutin, ...) situées dans les zones les plus précoces, il est préférable de choisir un produit également efficace contre cette maladie, si on décide d'intervenir contre la septoriose. Dans les autres situations, l'emploi de tels produits (nettement plus coûteux) semble actuellement superflu, d'autant plus que leur rémanence est insuffisante pour assurer une protection jusqu'à la fin de la période sensible : une application complémentaire avec un produit spécifique pourra être envisagée si nécessaire.

RHYNCHOSPORIOSE SUR ORGES D'HIVER ET DE PRINTEMPS

La rhynchosporiose progresse encore sur les orges d'hiver non traitées. Réaliser de toute urgence le deuxième traitement (conseillé dans notre précédent bulletin) si cela n'a pas encore été fait.

Sur les orges de printemps, semées précocement, des attaques assez graves sont à craindre : si la maladie est déjà installée dans la culture, faire un traitement dès que possible, et sans attendre la sortie des faches qui se produira dans une quinzaine de jours.

PUCERONS DES CEREALES

Il n'y a aucun risque d'attaque de pucerons cette année et il est donc inutile d'ajouter un insecticide aux traitements fongicides. Surveiller par contre l'apparition éventuelle de cécidomyies s'il survenait une période de temps très chaud dans les prochains jours.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 23 Mai 1979

Précédente Note : Bulletin n° 141 du 11.05.79

N° du papier de presse : 535 AD.

- 1.- Trouvez-vous que la nouvelle formule représente une amélioration appréciable
- dans sa présentation /OUI/ /NON/ - dans son contenu /OUI/ /NON/
- 2.- Pensez-vous que ce changement est susceptible d'augmenter l'intérêt que vous portez à PHYTOMA /OUI/ /NON/